

A continuación, el médico decidirá que hacer :

- quedarse en casa y monitorizar,
- ir a ver a un médico de cabecera,
- ir al servicio de neurocirugía que pueda recibirle,
- ir al servicio de la urgencias más cercano,
- esperar a la ambulancia o al equipo de urgencias.

En todos los casos, asegúrese de que disponen de todas las informaciones que le concierne :

- muestre su tarjeta de portador de válvula o este memo con las últimas actualizaciones,
- envíe copias de informes hospitalarios y de operaciones quirúrgicas e imágenes médicas de referencia en CD,
- indique el nombre del hospital y del neurocirujano de referencia, los médicos pueden necesitar ponerse en contacto con ellos.

5

Hospital de referencia :	

Neurocirujano de referencia :	

Nº de teléfono del servicio (24h/24) :	
00 33	

Fecha	Tipo / Ajustes

6



Protocolo
para atender de urgencia,
a niños y adultos,
operados de hidrocefalia

Tête en l'air

Forum 104
104 rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tel : :00 33 45 48 15 42

www.teteenlair.asso.fr
e-mail : tetenlair@wanadoo.fr

2
Cuando efectúe su llamada, debe imperativamente hacer mención de todas las palabras que figuran en rojo en este documento.

Planear siempre su viaje al extranjero con antelación :

- Lleve consigo su tarjeta de portador de válvula o este protocolo con los últimos cambios,
- Anote las referencias del servicio de neurocirugía más cercano a su domicilio.

A usted se le ha sido practicado una cirugía de hidrocefalia mediante la colocación de una válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo o mediante la realización de una ventriculostomía.

Si usted no es titular de una tarjeta de portador de válvula, pídala lo antes posible a su cirujano así como los registros de la hospitalización y operación y las imágenes médicas en CD.

3
Cuidado : Los medicamentos pueden enmascarar algunos de estos síntomas.

- **dolores de cabeza,**
- **nauseas, vómitos,**
- **visión borrosa, visión doble,**
- cansancio extremo,
- **ganas de dormir (somnia),**
- desacceleración intelectual,
- **fontanela abultada** (bebé),
- **convulsiones, crisis epilépticas.**

Usted o su hijo tiene uno o más de los síntomas siguientes :

1 / Identificar claramente los síntomas

Que hacer si usted piensa que su derivación no funciona ?

4
- Si usted esta tomando medicamentos.
- Los síntomas identificados,
cardíaca),
de urgencias pensara que se trata de una válvula (Si se refiere únicamente a "válvula", el servicio líquido cefalorraquídeo o una ventriculostomía.

- que es portador de una **válvula de derivación del líquido cefalorraquídeo** o una **ventriculostomía**.

Durante su llamada, especifique :

epilepsia).

- **urgencia (somnia o convulsiones/epilepsia).**
- al servicio de urgencias en casos de extrema **hablar con el cirujano de guardia 24h/24),**
- al servicio de neurocirugía más cercano (y pida llame de inmediato :

Si experimenta algunos de estos síntomas,

2 / Llame al servicio de neurocirugía más próximo o al servicio de urgencias